

Indicaciones sobre uso de vacunas frente a tos ferina en los programas de vacunación del SES ante el problema de suministro global.
(4 de junio de 2015)

Esquema de adaptación transitoria del Calendario de Vacunaciones Infantiles de Extremadura.

HEXAVALENTE

PENTAVALENTE

Retrasar la administrar de las dosis de dTpa de los 6 años

Calendario de vacunaciones sistemáticas infantiles de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 2015.									
0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	4 años	6 años	12 años	14 años
Hepatitis B (nota 1)	Hepatitis B	Hepatitis B	Hepatitis B						
	Tétanos	Tétanos	Tétanos		Tétanos		Tétanos		Tétanos adulto
	Difteria	Difteria	Difteria		Difteria		Difteria		Difteria adulto
	Tosferina acelular	Tosferina acelular	Tosferina acelular		Tosferina acelular		Tosferina acelular		
	Poliomielitis inactivada	Poliomielitis inactivada	Poliomielitis inactivada		Poliomielitis inactivada				
	Haemophilus influenzae b	Haemophilus influenzae b	Haemophilus influenzae b		Haemophilus influenzae b				
	Nemococo conjugada	Nemococo conjugada		Nemococo conjugada					
		Meningococo C (nota 2)		Meningococo C				Meningococo C	
				Sarampión		Sarampión			
				Rubéola		Rubéola			
				Parotiditis		Parotiditis			
								Varicela (nota 3)	
								VPH (nota 4)	

Notas:

(1) En niños de madres portadoras la pauta será de 0, 1 y 6 meses.

(2) Según ficha técnica de la vacuna utilizada puede ser necesario la primovacunación con una sola dosis (a los 4 meses) o con dos dosis (a los 2 y 4 meses)

(3) Para personas NO vacunadas previamente y que manifiesten no haber pasado dicha enfermedad. Pauta completa según ficha técnica del preparado utilizado.

(4) Vacuna frente al virus del papiloma humano, sólo para niñas. Pauta completa según ficha técnica del preparado utilizado.

Resumen:

- Utilizar vacuna **HEXAVALENTE** a los **2, 4 y 6** meses de edad.
- Utilizar vacuna **PENTAVALENTE** a los **18 meses**, exclusivamente.
- **Retrasar** la administración de la **dosis de dTpa de los 6 años**.